



ประเด็นเสวนาหัวข้อ

“ การเสริมสร้างความปลอดภัย ในสถานศึกษาผ่านความร่วมมือเครือข่าย ”



วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569



เวลา 09.00-11.00 น.




ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร




กลุ่มประชากรที่เสพยาเสพติด (ฐานข้อมูลบำบัดรักษายาเสพติด) ปีงบประมาณ 2568


เพศ




อายุเข้าบำบัด และอายุที่ใช้อยาเสพติดครั้งแรก



การศึกษา




อาชีพ




ที่มา : ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ปีงบประมาณ 2568 ณ 1 ตุลาคม 2568


ประมาณการผู้เคยใช้สารเสพติดใน 1 ปี
(อายุ 12-65 ปี ไม่รวมภักุชา กระทั่งอม สารผสม)
1.9 ล้านคน หรือ **2.88%** จากประชากรทั้งหมด
แต่เมื่อรวม ภักุชา กระทั่งอม สารผสม
6 ล้านคน หรือ **9.09%** จากประชากรทั้งหมด




ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด/
สารเสพติด ในระบบสาธารณสุข
ปี 2568 ประมาณ 250,00 คน
0.38% จากประชากรทั้งหมด



สถานการณ์ยาเสพติด



เด็กและเยาวชน
ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด/สารเสพติด
คิดเป็นร้อยละ **0.27** เมื่อเทียบกับ
ประชากรเด็กและเยาวชนทั้งหมดของประเทศ
หรือคิดเป็นร้อยละ **0.1** เมื่อเทียบกับ
ประชากรทั้งหมดของประเทศ

ยาเสพติดที่แพร่ระบาด

ตัวยาที่เข้าบำบัด



ยาบ้า ยาบ้านำไปสู่อาการทางจิต

- การใช้ยาบ้าในระยะสั้น มีผลให้เกิดอาการโรคจิตเฉียบพลัน (acute psychosis) ได้ อาการเด่นคือ ประสาทหลอน ทำให้มีการรับรู้และความคิดที่ผิดปกติ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและเหตุผล ขาดความยับยั้งชั่งใจ



- การใช้ยาบ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้เกิดอาการของโรคจิต หวาดกลัว ประสาทหลอน มีพฤติกรรมก้าวร้าว ย้ำคิด ย้ำทำ เป็นโรคซึมเศร้า และเพิ่มความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายผู้อื่น

- การใช้ยาบ้าตั้งแต่อายุน้อย ใช้บ่อย และปริมาณมาก มีผลทำให้เกิดการเสพติด และเกิดอาการทางจิต



- การใช้ยาบ้าร่วมกับยาเสพติด/สารเสพติดอื่น แบบผสมผสาน หรือสลับ ทำให้โอกาสเกิดจิตเวชสูงขึ้น

พอตบุหรี่ไฟฟ้า ผสมสารเสพติด

บุหรี่ไฟฟ้า (ELECTRIC CIGARETTE)



เอโทมิดेट

สารเอโทมิดेट (Etomidate)

เป็นยาสงบสติอารมณ์อย่างรุนแรงใช้เพื่อการดมยาสลบในห้องผ่าตัด ในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาทางหัวใจและหลอดเลือด มีพิษต่อระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกัน

ต้องได้รับยาตามแผนการรักษาอย่างเคร่งครัด

พบการนำ Etomidate มาทำเป็นบุหรี่ไฟฟ้า ขายให้วัยรุ่นในร้านและบนโซเชียลมีเดีย มีชื่อเรียกว่า "บุรี่ชอน" หรือ "บุรี่ไฟฟ้ากัญชา"

เมื่อ 67 ที่ผ่านมามี สวท. ตรวจพบพบสารเอโทมิดेट (Etomidate) ในบุหรี่ไฟฟ้า 3 ชนิด (ผู้ต้องหา : 1 คน) ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

5 ร.ค.67

Etomidate เป็นยาสงบสติอารมณ์อย่างรุนแรง ใช้เพื่อการดมยาสลบในห้องผ่าตัด มีพิษต่อระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกัน



คีตาหมิ่น

บุกจับหนุ่มหล่อหัวใส เข้าห้องรายวัน ขายบุหรี่ไฟฟ้า-พอตยาเค เสพยาไอซ์ โดนแจ้ง 4 ข้อหาหนัก



พอตบุหรี่ไฟฟ้า ผสมสารในกลุ่มยาเสพติด คีตาหมิ่น เอโทมิดेट

ที่มา : ผศ. ไพฑูรย์ สอนทน และคณะ, โครงการความชุกของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้กัญชา และการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเพชรบูรณ์



ข้อมูลจากการสำรวจประชากรไทย (ช่วงอายุ 12 - 65 ปี)



ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในรอบปีที่ผ่านมา 4.37 ล้านคน

ผู้ใช้ประจำ (ภายใน 1 เดือน) 2.67 ล้านคน

ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ประมาณ 10.59 ล้านคน



เยาวชนอายุ 12 - 17 ปี

เพศหญิง: 200,000 คน


เพศชาย: 300,000 คน

แนวโน้มเพิ่มขึ้น - คิดเป็น 40%)

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้กัญชา 19 เท่า



สารเสพติดที่ควรเฝ้าระวัง / ที่พบขายออนไลน์



ช่องทางการติดต่อ

การจัดส่ง



เคเฟทรหรือเคนมสด



สารกระตุ้นประสาท (ได้แก่ ไอซ์ ยาบ้า ยาอี โคเคน)



ไอซ์แบบเกล็ด เข้มฉืด



ยาบ้าพร้อมไอซ์



ยาอี



สารกดประสาท ระวังประสาท (ได้แก่ เฮโรอีน เมทาโดน แอลเอสดี)



เฮโรอีน



เมทาโดน

การปรับรูปแบบของสารเสพติดยาเสพติด



ตามาตลอด ชนิดน้ำ



NPS : คีตาบิน เห็ดเมา ดีเอ็มที Fentanyl NEP DMT 2CB เห็ดเมา บัวอียิปต์ 5-MEO-DMT อายาวัสกา (Ayahuasca)



บัวอียิปต์



อายาวัสกา (Ayahuasca)
เป็นพืชธรรมชาติที่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท



แอลเอสดี



เบนโท

ที่มา : กนิษฐา ไทยกล้า หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานการณ์ตลาดยาเสพติดในสื่อสังคมออนไลน์

คำ อีโมจิ และสัญลักษณ์ ที่ใช้ในการจำหน่ายยาเสพติดในสื่อสังคมออนไลน์

ตัวอย่าง: อีโมจิ

“...มีงานแบ่งขายครับ สนใจตัวไหนสอบถามได้ครับ ไม่ต้องโอนก่อน ❄️...”

“...พร้อมบิน ❄️🚀 ของเขาใหม่ละนะค้าบบ 🚀🏆 Very 1G 1200 ❄️🏆 Premium 1G 1400 ❄️🏆 เล็ก 650 🏆😊 #ไฮทอม #ไฮน้ำแข็ง #ไฮรังสิต #ไฮพญา

“...สุมแจกรับ มีสิทธิ์ลุ้น ทั้งลูกค้าใหม่ & ลูกค้าเก่า 🙋 กติกา > กดติดตาม > กดรีทวีต > กดใจโพสต์นี้ มาร่วมเล่นกันอีกรอบนะครับ เนื่องจากทวิตเก่าโดนระงับไป ❄️ ประกาศ รางวัล วันที่ 28 นี้ เวลา 13.00 น. ❄️ ...”

ชนิดยาเสพติด / สัญลักษณ์ Emojis	ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้เรียก
❄️	ไอซ์
💎	ไอซ์
💍	ไอซ์
🍊	ยาบ้าเม็ดสีส้ม
🍎🐎	ยาบ้าเม็ดสีส้ม
🍌	ยาอี
🍔	ยาอี
👻	การเตือนจากผู้ขายไอซ์ ว่าให้ระวังตำรวจจับ ช่วงนี้ตำรวจเอาจริง
📦	คีตามีน
🚗🐟	เฮโรอีนงานไขปลา
🐯🌐🌐	เฮโรอีนตราสิงโตเหยียบลูกโลก
🐯🌐🌐	เฮโรอีนตราสิงโตเหยียบลูกโลก งานไขปลา
🌿	ต้นโคคา
🍒	เมล็ดโคคา
🚬	พอตเค
💧	หัวพอตเค
🦋	พอตเค
🚬🍌🍒🍇	พอตเคที่ขาย มีกลิ่นและรสของผลไม้

ตัวอย่าง: คำสแลง

ชนิดสารเสพติด / คำเรียก	ชนิดสารเสพติด / คำเรียก	ชนิดสารเสพติด / คำเรียก
ไอซ์	ยาบ้า	ยาอี
กระเบื้องหินอ่อน	Small	md = ตัวย่อของ MDMA
น้ำใสๆ	ก้อน	อาหารแมว
กระจกใส	ม้าสีส้ม	เฮโรอีน
สายแข็ง	ยาเม็ด	ไวท์เชียงใหม่
ว๊ิงๆ	ตัว	H.R.I.
งานว๊ิงๆ	ตัวเล็กว้ายวัน	อีขาว
I	ส้มๆ	แป้งสิงห์ = เฮโรอีนตราสิงโตเหยียบโลก
แอลเอสดี	เห็ดเมา	ต้นโคคา
L*D	กะหล่ำปลี	พลังใบโคลัมเบีย
ฝิ่น	พอตเค	เอโทมิเดต
เมล็ดfin	พอตชอมบี้	eto oil
	ริชาจมิว	Etomidate crystal

สารเสพติดแบบผสมที่พบลักลอบจำหน่ายในออนไลน์

2563



พฤษภาคม 63

- พบ “Lean” ผสม Promethazine (ยาแก้แพ้) และ Codeine

2564




มิถุนายน 63

- พบ “เคนมผง” ครั้งแรก



กรกฎาคม 63

- พบ “Happy Water” ครั้งแรก



มิถุนายน 64

- พบ “Lean” ผสมยา ترامาดอล



ตุลาคม 64

- พบ “กาแฟซอง”

2565



สิงหาคม 65

- Happy Water เริ่มได้รับความนิยม



กันยายน 65

- คอลลาเจนสายตี้

2569



มีนาคม 69

- รับผสมยาเสพติดตามสั่ง/รับออกแบบยาผสม



สิงหาคม 67

- พอตเค



พฤษภาคม 67

- น้ำบลูแบบเยลลี่



มีนาคม 67

- น้ำบลู



มกราคม 67

- ลูกอมเมา

2567




กรกฎาคม 66

- คอลลาเจนแบบเยลลี่ พร้อมดูด

2566



รูปแบบยาเสพติด/สารเสพติดแบบผสม



1



รูปแบบเม็ด
(Tablet / Pill)

ยาเสพติดที่ถูกอัดเป็นเม็ดทรงกลมแบน
ทรงรี ทรงเหลี่ยมหรือรูปทรงต่าง ๆ
พบมีการปั๊มตราประทับหรือตรา
สัญลักษณ์บนเม็ด ได้แก่

- ยาอีชนิดเม็ด
- วัตถุออกฤทธิ์ชนิดเม็ด ฯ



ช่วงระยะเวลาที่ตรวจพบสารเสพติดในรูปแบบผสม
จากการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลาง
ที่ส่งตรวจพิสูจน์ที่ สวพ.


2556

เริ่มตรวจพบว่ายาอี มีส่วนผสมของ
สารเสพติดมากกว่า 2 ชนิด แต่เพียง
แค่บางตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งต่างจากผล
การตรวจพิสูจน์ยาอี ก่อนหน้านี้
ตรวจพบเพียง MDMA HCl
เป็นส่วนผสม



2563

Happy water ตัวอย่างแรกจากพื้นที่
ภาค 7 เป็นผงสีขาว จำนวน 1 ซอง
น้ำหนักสุทธิ 1.842 กรัม ตรวจพบ
Meth + MDMA + Diazepam
+ Tramadol



2564

(ต้นปี)

เหตุการณ์ "เคนมผง" ในประเทศ
ไทย การเพิ่มขึ้นของสารผสมใน
ยาอี อย่างมีนัยสำคัญ



2564

(ปลายปี)

ตรวจพบ กาแฟ 3 in 1 ที่มีส่วนผสม
ของสารเสพติด หลายชนิด



2567

(ต้นปี)

อมยิ้มเคลือบยาเสพติดและวัตถุ
ออกฤทธิ์หลายชนิด



2567

(กลางปี)

Pod K เอโทมิต
ในพอดบุรี่ไฟฟ้า



2



รูปแบบผง/ผลึก
(Powder / Crystal)

ยาเสพติดที่มีลักษณะเป็นผง/ผลึก
สีขาว สีขาวออกน้ำตาล หรือสีอื่น ๆ ได้แก่

- เคนมผง
- Happy water
- อมยิ้ม ฯ



3



รูปแบบของเหลว
(Liquid)


ยาเสพติดที่อยู่ในรูปน้ำ น้ำมัน ได้แก่
Happy water ที่อยู่ในรูปของเหลว
น้ำธนู พอตบุรี่ไฟฟ้า ฯ

- Happy water ที่อยู่ในรูปของเหลว
- น้ำธนู
- พอตบุรี่ไฟฟ้า





รูปแบบยาเสพติด/สารเสพติดแบบผสม (ยาอี)




2555 - 2559



2560 - 2563



2564 - 2569



จำนวนเม็ดยาที่ตรวจพบในแต่ละรูปแบบสารออกฤทธิ์

จำนวน (เม็ด)

600,000

500,000

400,000


300,000

200,000

100,000

0

- กลุ่ม 1: ยาอีที่มี MDMA เป็นสารออกฤทธิ์หลักในรูปสารเดี่ยว
- กลุ่ม 2: ยาอีที่มี MDMA เป็นสารออกฤทธิ์หลักในรูปแบบสารผสม
- กลุ่ม 3: ยาอีที่ไม่มีสาร MDMA เป็นสารออกฤทธิ์หลัก



2556

เริ่มพบการผสมสารในยาอี



2563 - 2564

จุดเปลี่ยนสำคัญ



2569 (B.E.)

กลุ่มสารผสมเด่นชัด



ประเด็นสำคัญ

- ปี 2565 มีจำนวนตรวจพบรวมสูงสุด **461,507** เม็ด
- กลุ่ม 1 เด่นมากในปี 2563 และ 2565
- กลุ่ม 2 เพิ่มสูงชัดเจนในปี 2564 และพุ่งอีกครั้งในปี 2569 (B.E.)
- กลุ่ม 3 มีสัดส่วนต่ำ แต่ตรวจพบต่อเนื่อง



ข้อสังเกตเชิงแนวโน้ม

- รูปแบบยาอีมีความหลากหลายมากขึ้น จากสารเดี่ยวไปสู่สารผสม
- แนวโน้มตั้งแต่ปี 2563 สะท้อนการพบกลุ่มสารผสมชัดเจนมากขึ้น
- ปี 2569 (B.E.) พบการเปลี่ยนสัดส่วน โดยกลุ่ม 2 สูงกว่ากลุ่ม 1 อย่างเด่นชัด



ตัวอย่างรูปแบบยาไอ

ที่ตรวจพบ MDMA เป็นสารเดี่ยว และสารเสพติดแบบผสม ตั้งแต่ 2 สาร ขึ้นไป

รูปแบบสารผสม	รูปแบบยา
1 MDMA	
2 MDMA + Met	
3 MDMA + Ket	
4 MDMA + 2 CB	
5 MDMA + Met + Ket	
6 MDMA + Met + PMMA + Ket	
7 MDMA + Met + Mep + Ket	
8 MDMA + Met + Ket + Nim	
9 MDMA + Met + Her + Ket	
10 MDMA + Met + Ket + Dia	

MDMA
40-50%

ความ
บริสุทธิ์
ของสาร
แต่ละชนิด
ไม่คงที่
ตรวจพบ
อยู่
ระหว่าง
0.04 -
85%



ที่มาข้อมูล : ระบบข้อมูลตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (DIS) สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.





ตัวอย่างเม็ดยาอีริมิน 5 หรือ ไฟว์ ไฟว์ ที่พบสารเสพติดแบบผสม

- ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2569 พบเม็ดยาอีริมิน 5 หรือ ไฟว์ ไฟว์ ที่มีส่วนผสมของสารเสพติดแบบผสมในหลายตัวอย่าง



ไนเมตาซีแพม
(แบบดั้งเดิม)



เฮโรอีน +
วิตามิน



ไนตราซีแพม +
ไนเมตาซีแพม



เฮโรอีน +
วิตามิน + โคลนาซีแพม



ที่มาข้อมูล : ระบบข้อมูลตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (DIS) สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.



ตัวอย่างเม็ดยาอีริมิน 5 หรือ ไฟว์ ไฟว์ ที่พบสารเสพติดแบบผสม

- ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2569 พบเม็ดยาอีริมิน 5 หรือ ไฟว์ ไฟว์ ที่มีส่วนผสมของสารเสพติดแบบผสมในหลายตัวอย่าง

จับกุมได้ในพื้นที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22/02/2568 จำนวน 90 เม็ด

ตรวจพบ


- คีตามีน ร้อยละ 0.50
- เฮโรอีน ร้อยละ 0.46
- เมทแอมเฟตามีน ร้อยละ 0.17
- ไดอะซีแพม ร้อยละ 0.05
- กาเฟอีน



ที่มาข้อมูล : ระบบข้อมูลตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (DIS) สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.



เคนมผง



- ✓ เคนมผง ถูกตรวจพบและเริ่มแพร่ระบาดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือน มกราคม 2564
- ✓ สถิติการตรวจพิสูจน์ของกลางเคนมผงที่ส่งตรวจพิสูจน์ที่ สวพ. ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2569 **2565 -2569 X**
- ✓ ของกลางทั้งหมด 13 คดี (17 ตัวอย่าง) รวม 78 ขง น้ำหนักสุทธิ 95.339 กรัม
- ✓ จากการตรวจพิสูจน์พบว่า ส่วนผสมของเคนมผง ตรวจพบไดอะซีแพมผสมที่ทวน ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันในแต่ละคดี



เริ่มพบครั้งแรก
มกราคม 2564



13 คดี
(17 ตัวอย่าง)



78 ขง



น้ำหนักสุทธิ
95.339 กรัม



ตรวจพบไดอะซีแพม
ผสมคีตามีน
ไดอะซีแพม 11 – 99 %
คีตามีน 0.03 – 95 %

ตัวอย่างของกลางที่ตรวจพบ



ที่มาข้อมูล : สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.



อมยิ้ม



ในเดือนมกราคม 2567 ตรวจพบการลักลอบจำหน่ายอมยิ้มที่มีการเจือปนสารเสพติด ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย ตรวจพบในช่วงเวลาสั้น ๆ และจากการตรวจพิสูจน์พบเพียง 3 คดีเท่านั้น โดยตรวจพบสารผสม ได้แก่ MDMA, Ketamine, Nimetazepam, Tramadol, Flunitrazepam และ Caffeine

สารเสพติดที่ตรวจพบ


- MDMA
- Ketamine
- Nimetazepam
- Tramadol
- Caffeine

ตรวจพบ
3
คดี

ตัวอย่างของกลางที่ตรวจพบ



Nimetazepam + Tramadol



Ketamine + Tramadol



MDMA + Ketamine + Nimetazepam + Tramadol






Happy water

ลักษณะของกลาง Happy water พบได้ทั้งในรูปผงหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ และมีกลิ่นหอม ภายในหรือบรรจุภัณฑ์เลียนแบบผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เช่น ของเครื่องดื่ม กาแฟ อาหารเสริม หรือขนม ทำให้พบได้หลายรูปแบบ

แนวโน้มของกลาง Happy water (พ.ศ. 2565 – 2569)



ตัวอย่างภาชนะ/บรรจุภัณฑ์ของกลาง Happy water



ปริมาณสารที่พบใน Happy water

สาร	ช่วงปริมาณ (มก./กรัม)
MDMA	0.12 – 83.36
Methamphetamine	0.05 – 46.18
Heroin	0.09 – 2.70
Ketamine	0.06 – 83.79
Diazepam	0.07 – 24.59
Nimetazepam	0.02 – 4.41
Nitrazepam	1.47 – 1.48



สารอื่นที่ตรวจพบ

- Caffeine
- Dextromethorphan
- MDP2P
- Amphetamine
- Safrole
- Lidocaine
- 6-MAM
- Acetylcodeine
- Hydrazinize



Happy water (แบบน้ำ)

ข้อมูลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ของกลางประเภท Happy water รูปแบบของเหลว



สรุปข้อมูลการตรวจพบ

Happy water รูปแบบของเหลว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 (มี.ค.)

- จากตัวอย่างของกลางทั้งหมด จำนวน 5 คดี 15 ตัวอย่าง
- รวม 740 ถุง/ซอง/ถัง
- น้ำหนักสุทธิ 242.32 กิโลกรัม
- ผลการตรวจพิสูจน์ จำนวน 4 รูปแบบ



5
คดี



15
ตัวอย่าง



740

ถุง/ซอง/ถัง



242.32

กิโลกรัม



4

รูปแบบ



ตัวอย่างของกลาง Happy water (แบบน้ำ)



ปริมาณสารที่พบใน Happy water

ส่วนผสม รูปแบบที่	สารที่ตรวจพบเป็นสารผสม	ช่วงความบริสุทธิ์ (%) ที่ตรวจพบของแต่ละชนิด ปีงบประมาณ 2567-2569 (มี.ค.)
1	Ketamine	0.14 – 0.19
	Nimetazepam	0.02 – 0.06
2	Diazepam	0.02
	สารอื่น (Caffeine)	ไม่ระบุปริมาณ
3	Nimetazepam	น้อยกว่า 0.01
	Methamphetamine	น้อยกว่า 0.01
4	MDMA	0.09
	Ketamine	0.17
	Nimetazepam	น้อยกว่า 0.01
	สารอื่น (Caffeine)	ไม่ระบุปริมาณ



บุหรี่ยาไฟฟ้า



พอดเค (Pod K) เป็นผลิตภัณฑ์บุหรี่ยาไฟฟ้าประเภทพอดที่มีการลักลอบผสมสารออกฤทธิ์หรือยาเสพติดอันตรายหลายชนิดในของเหลวหรือน้ำพอด เพื่อให้ออกฤทธิ์มีนิมมาและหลอนประสาทอย่างรุนแรง จากการตรวจพิสูจน์ของกลางที่ส่งตรวจในช่วงปีงบประมาณ 2567-2569 (มี.ค.69) พบของกลางรวม 42 คดี 209 รายการ รวม 15,067 หลอด/ขวด น้ำหนักสุทธิ 22,257.517 กรัม

ตัวอย่างของกลางที่ตรวจพบ



ผลการตรวจพิสูจน์

สารที่ตรวจพบ	ปีงบประมาณ			
	2567	2568	2569 (มี.ค.69)	รวม
เอโทมิเตต	193	3,042	11,557	14,792
นิโคติน	-	-	155	155
THC	-	10	-	10
delta8-THC	-	1	-	1
นิโคติน + THC	-	-	4	4
นิโคติน + delta8-THC	-	-	3	3
CBD + THC + delta8-THC	-	-	2	2
CBN+CBD + THC + delta8-THC	-	-	22	22
เอโทมิเตต + นิโคติน	-	67	-	67
THC + delta8-THC	-	4	-	4
ตรวจไม่พบสารเสพติด	-	-	7*	7*
รวม	193	3,124	11,705	15,067

* ของเหลว-หนืด จำนวน 7 ขวด ตรวจพบ N-ethyl-3-hydroxypiperdrine



การพัฒนาระบบป้องกันยาเสพติด

มุ่งเน้นการใช้กระบวนการพัฒนาทักษะสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต
Executive Functions (EF)

พัฒนาเกราะป้องกันในแต่ละระดับ
เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรยาเสพติด



EF 9 ด้าน

ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเริ่มที่ตัวเรา




EF คือ ทักษะสมองส่วนหน้าที่ช่วยให้เราคิดเป็น ควบคุมตนเองเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีเป้าหมายในชีวิต ห่างไกลยาเสพติด

1 Working Memory (ความจำเพื่อใช้งาน)

ความสามารถในการจดจำ
ข้อมูลและนำมาใช้ในการคิด
หรือแก้ปัญหา

ช่วยให้เด็กจดจำผลเสียของยาเสพติด
และนำมาประกอบการตัดสินใจ



2 Inhibitory Control (การยั้งคิดไตร่ตรอง)



ความสามารถในการควบคุม
ตนเอง ไม่ทำตามอารมณ์
หรือสิ่งยั่วยุทันที

ช่วยให้ปฏิเสธการชักชวน
ให้ลองยาเสพติดได้

3 Shift / Cognitive Flexibility (การยืดหยุ่นความคิด)



ความสามารถในการปรับตัว
และมองปัญหาได้หลายมุม

เมื่อเจอปัญหาชีวิต
จะหาทางออกอื่น แทนการ
พึ่งยาเสพติด

4 Focus / Attention (การใส่ใจจดจ่อ)



ความสามารถในการมีสมาธิ
กับสิ่งที่กำลังทำ

ช่วยให้ตั้งใจเรียน ทำกิจกรรม
สร้างสรรค์ และห่างไกล
พฤติกรรมเสี่ยง

5 Emotional Control (การควบคุมอารมณ์)



ความสามารถในการจัดการ
อารมณ์ตนเอง

ไม่ใช้ยาเสพติดเป็นทางออก
เมื่อเกิดความเครียดหรือ
ความกดดัน

6 Self-Monitoring (การประเมินตนเอง)

การรู้เท่าทันพฤติกรรม
จุดแข็ง และจุดอ่อน
ของตนเอง

รู้ว่าจะอะไรคือความเสี่ยง
และสามารถปรับปรุง
ตนเองได้



7 Initiating (การเริ่มต้นลงมือทำ)

ความสามารถในการเริ่มต้น
ทำสิ่งที่เป็ประโยชน์
ด้วยตนเอง

กล้าเลือกทำกิจกรรมดี ๆ แทนการ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด



8 Planning and Organizing (การวางแผนและจัดระบบ)

ความสามารถในการกำหนด
เป้าหมายและจัดการงาน
อย่างเป็นระบบ

มีแผนชีวิตและมองอนาคต
ทำให้ไม่หลงไปกับพฤติกรรมเสี่ยง



9 Goal-Directed Persistence (การมุ่งเป้าหมาย)

ความพยายามทำตามเป้าหมาย
จนสำเร็จ แม้พบอุปสรรค

มีแรงจูงใจในการเรียน การทำงาน
และการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์



จุดเน้นการดำเนินนโยบายการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา



นำความรู้ยาเสพติดและทักษะชีวิตเพื่อการ
ป้องกันยาเสพติดไว้ในหลักสูตร
การเรียนการสอนในสถานศึกษาในแต่ละระดับ
ต่อเนื่องทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย - อุดมศึกษา



ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ทั้งรูปแบบ Online / Onsite



จัดการระบบในโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งและปลอดภัย
จากยาเสพติด ได้แก่ การป้องกัน
การค้นหา การรักษาดูแลช่วยเหลือ (ให้โอกาส)
การเฝ้าระวัง และการบริหารจัดการ
โดยสถานศึกษาดำเนินการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง



สำนักงาน ป.ป.ส.

ช่องทางการดาวน์โหลด

สื่อประชาสัมพันธ์



สายด่วน ป.ป.ส 1386.



จบการนำเสนอ

